

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. НЕНОКЛОНОВ

26.12.2014

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины антирабической из штамма «Щелково-51»  
инактивированной жидкой культуральной (Рабиков)  
(Организация-разработчик: ФКП «Щелковский биокOMBинат», Московская область)

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Международное непатентованное наименование - Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» инактивированная жидкая культуральная (Рабиков).

2. Лекарственная форма - суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированного  $\beta$ -пропиолактоном вируса бешенства штамм «Щелково-51» с добавлением 20 % гидрата окиси алюминия коллоидного (ГОА).

По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную суспензию светло-серого цвета, которая при отстаивании расслаивается с образованием рыхлого осадка светло-серого цвета и прозрачной надосадочной жидкости светло-желтого цвета.

Вакцина расфасована по 10 см<sup>3</sup> (2 дозы для крупного рогатого скота, 3 дозы для овец и коз, 5 доз для лошадей); 20 см<sup>3</sup> (4 дозы для крупного рогатого скота, 6 дозы для овец и коз, 10 доз для лошадей); 100 см<sup>3</sup> (20 доз для крупного рогатого скота, 33 дозы для овец и коз, 50 доз для лошадей) или 200 см<sup>3</sup> (40 доз для крупного рогатого скота, 66 доз для овец и коз, 100 доз для лошадей) во флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими их целостность. В каждую коробку с вакциной вкладывают инструкцию по ее применению. Коробки с вакциной упакованы в ящики или гофротару.

Срок годности вакцины – 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину транспортируют и хранят в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Допускается транспортирование и хранение вакцины в упаковке организационного производителя при температуре не выше 20°C не более 5 суток.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности закупорки, с измененным цветом и/или консистенцией, с наличием посторонних примесей, подвергнувшиеся замораживанию, с истекшим сроком годности, не использованные в течение 36 часов после вскрытия, бракуют, обеззараживают путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2%-ным раствором щелочи, или 5%-ным раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут. Аналогичным образом обрабатывают флаконы из-под вакцины, шприцы и иглы.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предо-

сторожности.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю бешенства у первично вакцинированных животных через 5-7 суток после однократного введения вакцины, иммунитет достигает своего максимума к 30-40 суткам и сохраняется в течение 1 года. В случае двукратного введения вакцины, с ревакцинацией через 30-50 суток, иммунитет сохраняется в течение 2 лет. Иммуногенная активность (индекс иммуногенности) 1 дозы вакцины не менее 1 МЕ.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактической и вынужденной вакцинации против бешенства крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

9. Запрещено вакцинировать животных, подозрительных по заболеванию бешенством.

10. Вакцинации подлежат животные, начиная с 3-месячного возраста. В районах свободных от бешенства, профилактическую иммунизацию проводят однократно, с последующей ревакцинацией через один год и в дальнейшем, один раз в два года.

*Примечание.* При заносе инфекции в эти районы, вакцинацию животных осуществляют, не дожидаясь окончания указанного годового интервала между первой и второй вакцинациями.

На территории стационарного неблагополучия по бешенству животных вакцинируют с профилактической целью двукратно с интервалом 30-50 дней, с последующей однократной ревакцинацией один раз в два года.

Вынужденную вакцинацию проводят не позднее 48 часов после возможного инфицирования животных. Вакцину вводят двукратно, с интервалом 14 дней в дозах, рекомендованных для профилактической вакцинации.

Каждый флакон перед применением и в процессе вакцинации необходимо тщательно взбалтывать.

Место инъекции обрабатывают 70%-ным этиловым спиртом или другим дезинфицирующим раствором. Для каждого животного используют отдельную иглу или шприц однократного применения.

Вакцину вводят с соблюдением правил асептики и антисептики подкожно в дозах:

- крупному рогатому скоту в область средней трети шеи или подгрудка - 5 см<sup>3</sup>;
- овцам и козам во внутреннюю поверхность бедра - 3 см<sup>3</sup>;
- лошадям в область средней трети шеи или подгрудка - 2 см<sup>3</sup>.

11. Симптомов проявления бешенства или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичном и последующих введениях вакцины не установлены.

13. Следует избегать нарушения схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики бешенства. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. У вакцинированных животных допускается формирование в месте инъекции небольшого уплотнения, исчезающего в течение двух недель.

15. Запрещается применение других вакцин совместно с вакциной «Рабиков», а также назначение за 10 суток до вакцинации и в течение 10 суток после введения вакцины иммуно-

биологических и фармацевтических противовирусных препаратов (иммунные сыворотки, гаммаглобулины, интерферон и др.).

16. Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных используют без ограничения.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

К участию в проведении вакцинации не допускаются лица с признаками респираторных, желудочно-кишечных и аллергических заболеваний.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5%-ным раствором хлорамина или 2%-ным раствором едкого натрия.

При случайном введении вакцины человеку место инъекции необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината.

Инструкция по применению вакцины антирабической из штамма «Щелково-51» инактивированной жидкой культуральной (Рабиков) разработана ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает действие «Инструкция по применению вакцины антирабической из штамма «Щелково-51» инактивированной жидкой культуральной (Рабиков)», утвержденная 28 марта 2012 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения – 32-1-8.12-2221 №ПВР-1-1.1/00664